

Štajerska cijepi/vakciniše!

Zašto biste se trebali cijepiti/vakcinisati?

Cijepivo/vakcina Vas štiti od COVID-19 oboljenja i smanjuje rizik da se drugi zaraze.

Kako djeluje cjepivo/vakcina?

Cijepljenjem/vakcinom tijelu se šalje informacija da počne stvarati antitijela. Ta antitijela štite tijelo od COVID-19 oboljenja. Cjepiva/vakcine u sebi ne sadržavaju virus (SARS-CoV-2).

Je li cjepivo/vakcina sigurno?

Da. Cjepivo/vakcina je testirano na sigurnost. Europska agencija za lijekove (EMA) dala je svoje odobrenje. Cjepivo/vakcina je također sigurno za ljude s dijabetesom, visokim krvnim tlakom, srčanim bolestima i astmom.

Kako dobiti termin za cijepljenje/vakcinaciju?

Cijepivo/vakcinu protiv korone možete dobiti na štajerskim cijepnim punktovima kao i u brojnim ordinacijama liječnika opće prakse. Trenutno nije potrebna registracija na štajerskim cijepnim punktovima.

[RADNO VRIJEME LINK](#)

[LINK PREGLED POPISA CIJEPNIH PUNKTOVA](#)

Molimo Vas da na termin za cijepljenje/vakcinaciju ponesete sljedeće dokumente:

- ✓ Potvrdu o prijavi cijepjenja/vakcinacije (u tiskanom ili dikitalnom obliku)
- ✓ Vašu važeću e-card
- ✓ Vaš karton za cijepljenje/vakcinaciju (ukoliko ga imate)
- ✓ Aktualnu listu lijekova koje pijete (ukoliko ista postoji)
- ✓ Ispunjeni informativni list i dokumentacijski upitnik za korona-cjepivo/vakcinu

Koliko puta se treba cijepiti/vakcinisati?

Za najbolju moguću i dugoročnu zaštitu Nacionalni odbor za cijepljenje/vakcinaciju preporuča ukupno 3 cijepjenja/vakcinacije za sve osobe od 5. godine života: 2 cijepjenja/vakcine za prvu seriju cijepjenja/vakcinacije te nakon 6 mjeseci daljnje cijepljenje/vakcinacija. Za osobe starije od 80 godina preporuča se dopunsko cijepljenje/vakcinacija (4. cijepljenje/vakcinacija) ne prije 4. mjeseca od 2. cijepjenja/vakcinacije, ali u svakom slučaju 6 mjeseci nakon primarne imunizacije (3. cijepljenje) (off-label). Osobe s rizičnim oboljenjima (bez obzira na dob, od 12 godina života) i osobe u dobi od 65 do 79 godina s već prisutnim oboljenjima i okolnostima koje predstavljaju povećan rizik od teških posljedica COVIDA-19 ili kojima se pokaže kraće djelovanje zaštite, moguće je, nakon medicinsko individualne procjene koristi i rizika, izvršiti ponovno cijepljenje/vakcinaciju najranije 4 mjeseca (4. cijepivo/vakcina), u idealnom slučaju 6 mjeseci nakon primarne imunizacije (tj. nakon 3. cijepjenja/vakcinacije).

Alergični ste. Treba li se unatoč tomu cijepiti/vakcinisati?

U tom slučaju zdravstveno osoblje će s Vama proći sastav cjepiva/vakcine, kako biste bili sigurno da je cijepljenje/vakcinacija za Vas moguće. Cjepivo/vakcina COVID-19 ne sadrži jaja, želatinu, konzervanse ili antibiotike.

Bili ste zaraženi COVID-19. Treba li Vam još cijepljenje/vakcinacija?

Da. Imunitet nakon bolesti COVID-19 štiti Vas određeno vrijeme, no postoji mogućnost ponovnog oboljenja od COVID-19. Stoga je bolje da se cijepite/vakcinišete i na taj način se zaštitite i smanjite rizik prijenosa virusa.

Postoje li nuspojave od cijepjenja/vakcinacije?

Nuspojave koje se mogu javiti: bol ili crvenilo na mjestu uboda igle, kao i glavobolja, vrućica i grčevi u mišićima. Te su reakcije prilično česte, ali su normalna pojava te obično prođu u roku od nekoliko dana. Nakon cijepjenja/vakcinacije ostajete na promatranju oko 15 minuta.

Je li cijepljenje/vakcinisanje dobrovoljno?

Od veljače/februara 2022. postoje obavezni opći uvjeti cijepjenja/vakcinisanja protiv Covid-19. Cijepljenjem/vakcinisanjem protiv korone štitite sebe i ljude oko sebe na najbolji mogući način.

Imate li pitanja o korona cijepljenju/vakcinaciji te sastavu samog cjepiva/vakcine?

Obratite se Saveznoj telefonskoj liniji za informacije: 0800 555 621

Sve informacije na „Štajerska cijepi/vakciniše“: www.impfen.steiermark.at

Predbilježba za cijepljenje/vakcinaciju: www.steiermarkimpft.at